

Daño Psicológico en un grupo de mujeres víctimas de violencia de pareja en Saltillo, México

Lara-Men, M.C., Torriente-Menéndez, C., Pérez-Pedraza, D.C., Hernández-Montaño, A.

¹Facultad de Psicología, Universidad Autónoma de Coahuila

Programa de posgrados Categoría *III Igualdad de Género, Reducción de las desigualdades y Justicia e instituciones sólidas*



Introducción

En México los índices de violencia de pareja son extremadamente alarmantes; este fenómeno es un serio problema sociocultural y de salud pública que genera serias afectaciones en la salud física y mental de las mujeres, siendo el maltrato psicológico el más frecuente¹. En Saltillo, son escasas las investigaciones relacionadas con la descripción de las características clínicas resultantes de las experiencias de violencia, que sienten las bases para el desarrollo de intervenciones eficaces.

Palabras claves: violencia de pareja; sintomatología clínica; salud mental.

Métodos


El objetivo de este trabajo es evaluar patrones de síntomas clínicos en un grupo de mujeres víctimas de violencia de pareja residentes en este territorio. Este estudio es empírico-analítico, de tipo cuantitativo, con nivel de alcance descriptivo; la selección de las participantes fue a través de un muestreo intencional², participaron 40 mujeres que reportaron ser víctimas de violencia de pareja residentes en la ciudad de Saltillo-Coahuila, con edades entre los 21 y 51 años. Para la recolección de los datos se utilizó el inventario de síntomas³. Para extraer los estadísticos descriptivos, se usó el paquete estadístico IBM SPSS versión 25.

Análisis

Se encontraron puntuaciones significativas en síntomas como las obsesiones y compulsiones que sitúan a estas mujeres en riesgo de desarrollar la patología asociada, además se encontró puntuaciones de riesgo elevado para el padecimiento de patologías como depresión, ansiedad fóbica, ansiedad y hostilidad.

Resultados

La exposición a situaciones de violencia en la pareja aumenta la probabilidad de padecer trastornos mentales, los resultados resaltan el impacto en los trastornos del estado del ánimo.



Conclusiones

Es evidente, la necesidad de continuar con investigaciones que estudien las dimensiones del impacto en la salud mental de las mujeres víctimas de violencia orientado al desarrollo de herramientas integrales para su intervención.

Referencias

Organización Mundial de la Salud (OMS, 2017) Nota descriptiva Noviembre-2017. Violencia contra la mujer. Recuperado de: <https://www.who.int/es/news-room/fact-sheets/detail/violence-against-women>; Hernández, R., Fernández, C., & Baptista, P. (2010). Metodología de la. Ciudad de México: Mc Graw Hill, 12, 20; González de Rivera, J.; De las Cuevas, C.; Rodríguez, M., & Rodríguez, F. (2002). Cuestionario de 90 síntomas SCL-90-R de Derogatis. Adaptación española. Madrid: TEA Ediciones.

Agradecimientos

Le agradecemos a todas las participantes por su tiempo y cooperación en el presente estudio.

